

# Salzsäure reagiert mit Marmor

## Auswertung

- Beispielwerte (pdf)
- Beispielwerte (odt)

### Fehler in den Originalwerten




Für die Konzentration der Wasserstoffionen treten negative Werte auf. Dies lässt darauf schließen, dass die Konzentration der verwendeten Salzsäure größer als 1mol/L ist, da durch den Überschuss des eingesetzten Marmor die Reaktion erst nach Verbrauch der Salzsäure zum Erliegen kommen kann.

Über die Menge der gebildeten Calciumionen kann aber auf die Ursprungskonzentration der Salzsäure geschlossen werden.

## Diagramm

Entwicklung der Konzentrationsverhältnisse

Salzsäure-Marmorreaktion



1. **Spalte E:** Entwicklung der Konzentration der Calciumionen
2. **Spalte 1:** Entwicklung der Konzentration der Wasserstoffionen



### Aufgabe 1:

100mL gesättigte Blei(II)-Chlorid-Lösung werden vom Bodenkörper abfiltriert und eingedampft. Die Masse des Bleichlorids beträgt 0,473g. Wie groß ist das



Löslichkeitsprodukt von Blei(II)-Chlorid?



**Aufgabe 2:**

Es liegen 100mL gesättigte Silberchloridlösung vor. Wie groß ist die Masse der gelösten Silber- und Chloridionen?  $K_L(\text{AgCl}) = 2 \cdot 10^{-10} \text{ mol}^2 \cdot \text{L}^{-2}$

From:  
<https://schule.riecken.de/> - Unterrichtswiki

Permanent link:  
<https://schule.riecken.de/doku.php?id=chemie:lesson:klasse12:kinetik:hclcac3&rev=1739175403>

Last update: 2025/02/10 08:16

