Aufgabe 1a (2 Punkte)

Bei einer chemischen Reaktion findet ein Energieumsatz statt. Energie kann dabei in unterschiedlichen Formen auftreten (Wärmeenergie, elektrische Energie, Volumenabeit usw.. Die molare Standardreaktionsenthalpie $\Delta_R H_m^0$ ist äquivalent zur Wärmemenge Q, die bei der Reaktion von einem Mol eines Stoffes bei Standardbedingungen (p=1013hPa, T=298K) frei wird.


Aufgabe 1b (2 Punkte)

Die molare Standardbildungsenthalpie $\Delta_f H_m^0$ ist ein Sonderfall der molare Standardreaktionsenthalpie $\Delta_R H_m^0$ (Gleichung 2), wenn ein Stoff aus den Elementen gebildet wird (Gleichung 1), bzw. in der Reaktionsgleichung ausschließlich Elemente auf der linken Seite stehen.


(1) $Fe + S \rightarrow FeS$; exotherm, $Q_m = \Delta_f H_m^0$
(2) $CO + 1/2O_2 \rightarrow CO_2$; exotherm, $Q_m = \Delta_R H_m^0$

Aufgabe 1c (4 Punkte)

Bei einer exothermen Reaktion gibt das System Energie an die Umgebung ab. Dadurch sinkt seine innere Energie U um die Betrag dieser Energieabgabe.



Bei einer endothermen Reaktion nimmt das System Energie aus der Umgebung auf. Dadurch steigt seine innere Energie U um die Betrag dieser Energieaufnahme.



Aus Sicht des System ist bei einem exothermen Vorgang daher die Definition einer negativen Energiebilanz sinnvoll, bei endothermen Vorgängen entsprechend umgekehrt.

Aufgabe 2a (4 Punkte)

gegeben:
V(Pool) = 8m·3m·1,6m = 38,4m³
m(Wasser) = 38400kg
c_{Wasser} = 4,19 kJ·kg^{-1}·K^{-1}
ΔT = 294K-291K = 3K

allgemein gilt:
(1) Q = c_p·m·ΔT

einsetzen:
Q = 4,19 kJ·kg^{-1}·K^{-1}·38400·3 = 482688kJ

Antwort:
Es wird eine Energiemenge von 482688kJ benötigt.

Aufgabe 2b (4 Punkte)

gegeben:
$\Delta_R H_m^0$ = -890kJ/mol (Verbrennungswärme von Methan)
V_m = 22,4l (molares Volumen idealer Gase)
Preis(Methan) = 11ct/m³
Q = 482688kJ
Verluste: 20%

allgemein gilt:
(1) 1 Mol Methan gibt 890kJ an Wärmeenergie ab. Der Quotient aus Energiemenge und molarer Verbrennungswärme liefert die benötigte Stoffmenge an Methan.
(2) Das Produkt aus Stoffmenge und molarem Volumen liefert das benötigte Volumen an Methan.
(3) Das Produkt aus Volumen in m³, Preis in ct/m³ und 1,2 (Verluste) liefert den Preis.

Rechnung:
(1) $Q/V_m = 482688kJ/890kJ \cdot mol^{-1} \approx 542,3mol$
(2) $n \cdot 22,4l = 12147,52l \approx 12,1m^3$
(3) $12,1m^3 \cdot 11ct/m^3 \cdot 1,2 = 159,72ct = 1,5972$ Euro

Das Aufheizen des Pools kostet etwa 1,60 Euro beim momentanen Energiepreis..

Aufgabe 3a (8 Punkte)

Es soll eine Temperaturerhöhung ΔT von 55K für 200g Kaffee (= 0,2kg) erreicht werden. Bekannt ist die auf ein Mol bezogene Wärmemenge, die bei der Reaktion von festem Calciumoxid frei wird: $\Delta_R H$ = -65kJ/mol.

gegeben:
ΔT = 55K
m(Kaffee) = 200g = 0,2kg
$c_{Wasser} = 4,19\ kJ \cdot kg^{-1} \cdot K^{-1}$
$\Delta_R H = -65kJ/mol$
M(CaO) = M(Ca) + M(O) = 56g

allgemein gilt:
(1) $Q = c_p \cdot m \cdot \Delta T$

Bei der Aufgabe gibt es den Sonderfall, dass unterschiedliche Kombinationen aus Wasser und Calciumoxid die benötigte Wärmemenge bereitstellen können. Daher wird in einer ersten Näherung zunächst mit 1Mol Calciumoxid (56g) und 100g Wasser gerechnet. Da das Calciumoxid selbst auch erwärmt werden muss, sollte man es bei der Masse m berücksichtigen.

Berechnung von ΔT für 0,1kg Wasser und einem Mol Calciumoxid (0,056kg), d.h. zunächst Umstellung von (1) nach ΔT.

(2) $\Delta T = \Delta_R H \cdot c_{Wasser}^{-1} \cdot m^{-1}$

Danach ist bekannt, welches ΔT ein Einsatz von einem Mol Calciumoxid zusammen mit 0,156kg Masse innerhalb der Dose bewirkt. Die Wärmemenge aus dem Mantel wird an den Doseninhalt abgegeben, ist also positiv.

Das muss lediglich hochgerechnet werden auf ΔT = 55K. Dabei handelt es sich um einen einfachen Dreisatz, weil die Gleichung proportional ist (nur Multiplikation, lineare Gleichung).

Man erhält dann eine Stoffmenge an Calciumoxid, die man über die bekannte molare Masse M in eine Masse umrechnen kann.

Rechnung:
$\Delta T = 65kJ / (4,19kJ \cdot kg^{-1} \cdot K^{-1} \cdot 0,156kg)^{-1} \approx$ **99,4K**
Mit einem Mol Calciumoxid und 0,1kg Wasser lässt sich als eine Temperaturerhöhung von 99,4K im Dosenmantel erreichen.

1 mol/99.4K = x mol / 55K
x = 55K·1mol/99,4K ≈ **0,55mol**
Man benötigt also 0.55mol Calciumoxid für eine Erwärmung um 55K.

0,55mol·56g/mol ≈ **30,8g**
Es wird eine Masse von 30,8g Calciumoxid benötigt, um eine Erwärmung von 55K im Dosenmantel zu erreichen.

Alternativer Ansatz:

Welche Wärmemenge Q wird benötigt, um 0,2kg Wasser um 55K zu erwärmen?
$Q = (4{,}19 kJ \cdot kg^{-1} \cdot K^{-1} \cdot 0{,}2 kg \cdot 55 K \approx 46 kJ$

Welche Menge an Calciumoxid ist dafür erforderlich?
1 Mol Calciumoxid gibt 65kJ an die Umgebung ab. Wie viel Mol geben 46kJ an die Umgebung ab? 1 mol/65kJ = x mol / 46kJ
x = 46kJ·1mol/65kJ ≈ **0.7mol**

Das entspricht einer Masse von 0.7mol * 56g/mol = **39,2g**.

Aufgabe 3b (2 Punkte)

Man setzt 30,8g Calciumoxid und 0,1kg zusätzliches Wasser für die Erwärmung ein. Diese Stoffe müssen genau wie die Dose selbst durch die Reaktion mit erwärmt werden. Zusätzlich ist in der Realität nicht von einem geschlossenem System auszugehen, sodass Wärmeverluste auftreten.

Aufgabe 4 (2 Punkte)

Der Satz von Hess besagt, dass die Menge der umgesetzten Energie nicht vom Reaktionsweg abhängt. Die Gleichung

$\Delta_R H_1 = \Delta_R H_2 + \Delta_R H_3$ lässt sich umstellen zu:
$\Delta_R H_3 = \Delta_R H_1 - \Delta_R H_2$

Damit ist $\Delta_R H_3$ berechenbar.

From:
https://schule.riecken.de/ - **Unterrichtswiki**

Permanent link:
https://schule.riecken.de/doku.php?id=chemie:lesson:klasse12:kl02muster&rev=1730558387

Last update: **2024/11/02 14:39**